

DENTACAIN® 200

Articaine 4% / Epinephrine 1:200.000

دنتاکاین® ۲۰۰

آرتیکائین ۴٪ / اپی نفرین ۱:۲۰۰،۰۰۰

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

دسته دارویی:

بی حس کننده موضعی آملیدی

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به بی حس کننده های موضعی آملیدی
- در صورت ابتلا به مشکلات قلبی و عروقی
- در صورت وجود مشکلات تنفسی
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر G6PD Deficiency یا مت هموگلوبینمیا
- در کودکان، سالمندان و افراد ضعیف و ناتوان با احتیاط مصرف شود.^{۱،۲}

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به این دارو و یا سایر اجزای فرآورده از جمله سولفیت
- در بیماران مبتلا به بلاک قلبی کامل، فشار خون شدید و خونریزی
- در بیماران پورفیری^۳

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو در گروه C قرار دارد و مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی شود. لذا مزایای مصرف این دارو نسبت به مضرات آن باید سنجیده شود.
- بعد از تزریق به مدت ۴۸ ساعت از شیردهی اجتناب شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

- این فرآورده صرفاً جهت مصارف دندانپزشکی می باشد.
- در صورت وجود سرع، شوک، اختلالات هدایتی قلبی و میاستنی گراویس با احتیاط مصرف شود.
- در بیماران مبتلا به نارسایی عملکرد کلیه یا کبد با احتیاط مصرف شود.
- در صورت وجود مشکلات تنفسی با احتیاط مصرف شود.
- به منظور جلوگیری از تزریق داخل رگ، تزریق می بایست همراه با اسپیراسیون باشد.
- از تزریق بی حس کننده های موضعی در بافت متورم و عفونی خودداری شود.

تداخلات دارویی:

این دارو ممکن است با داروهای زیر تداخل داشته باشد:

داروهای MAOIs و ضدافسردگی های سه حلقه ای، لووتیروکسین، بتابلاکرها، آلفابلاکرها، آدرنژیک^۴

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان:
۱ الی ۵/۱ میلی لیتر از محلول تزریقی ۴ درصد. ۴۰ تا ۲۰۴ میلی گرم دوز کلی.
دقت شود که این مقدار از ۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن (۰/۱۷۵) میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) بیشتر نشود.
- کودکان:

میزان تزریق بایستی به نسبت سن بیمار و نوع درمان وی تنظیم گردد.

در کودکان زیر ۴ سال نباید مصرف شود.

در اطفال ۴ تا ۱۲ سال، از میزان ۵ میلی گرم آرتیکائین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن نبایستی تجاوز نماید.

در اطفال با وزن ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم دوز ۰/۲۵ تا ۱ میلی لیتر کافی خواهد بود.

میزان ۱/۵ میلی لیتر در طی هر بار استفاده و حداکثر از میزان ۲/۵ میلی لیتر در طی ۲۴ ساعت نبایستی تجاوز نماید.
در کودکان با وزن بین ۲۰ تا ۴۵ کیلوگرم میزان ۰/۵ تا ۲ میلی لیتر کافی خواهد بود.
میزان ۲ میلی لیتر در طی هر بار استفاده و حداکثر از میزان ۵ میلی لیتر در طی ۲۴ ساعت نبایستی تجاوز نماید.
این فرآورده بایستی به آرامی تزریق گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود لذا در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در مورد استفاده ی دقیق و درست این دارو عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است. عوارض جانبی ممکن است در نتیجه ی روش اشتباه تزریق و بلاک سیستم عصبی سمپاتیک ایجاد شود. همچنین بی حس کننده های موضعی ممکن است عوارض سیستماتیک به دلیل افزایش غلظت پلاسمایی آنها ایجاد کنند. این عوارض ممکن است در نتیجه ی تزریق وریدی تصادفی، تزریق دوز بیش از حد و یا سریع، جذب مقدار زیاد از غشای مخاطی و یا پوست آسیب دیده نمایان شوند.

عوارض سیستم عصبی مرکزی: بی قراری، عصبانیت، پاراستزی، سرگیجه، تهوع و استفراغ، وزوز گوش، تاری دید، انقباض مردمک، کشش و لرزش عضله، تشنج، بی حسی زبان و اطراف دهان، سبکی سر، افسردگی

- عوارض قلبی و عروقی: دپرسیون قلبی، اتساع عروق محیطی و در نتیجه افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، آریتمی، مت هموگلوبینمیا

- به دلیل وجود سولفیت ممکن است منجر به بروز واکنش های حساسیتی شود.

- واکنش های حساسیتی نسبت به سایر بی حس کننده های موضعی خیلی به ندرت ممکن است رخ دهد.^{۱،۲}

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمائید.

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.^۱

- از اتوکلاو نمودن فرآورده پرهیز کنید.

- جهت ضدفونی نمودن سطوح خارجی کارتریج در صورت لزوم از محلول ایزوپروپیل الکل ۹۱ درصد و یا اتانول ۷۰ درصد استفاده شود. محلول های حاوی آمونیم کوآترنر و حاوی فلزات سنگین نباید به کار گرفته شود.

اشکال دارویی و بسته بندی:

آرتیکائین/ اپی نفرین تولیدی توسط شرکت داروسازی اکسیر به صورت کارتریج ۱/۸ میلی لیتری است که در بسته بندی های ۵۰ عددی به همراه بروشور به بازار عرضه می گردد.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

Reference:

- 1- BNF 2014 - 2015, pages: 876 - 878
- 2- Martindale36th Edition, pages: 1850 - 1854
- 3- PDR67th Edition, pages: 1859 - 1860



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وبسایت: www.exir.co.ir



2205039/IR1

EXIR 28 06 94
W*L=120 * 175 mm
Process Black U
355 U