

## GC MI Paste Plus®

TOPICAL CREME WITH CALCIUM, PHOSPHATE AND FLUORIDE
For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

**BESCHREIBUNG**
GC MI Paste Plus is a water based creme containing RECALDENT™\*\* with incorporated fluoride (CPP-ACPF: Casenin Phosphopetite-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). The level of fluoride is 0.2% ww/w (900ppm), which approximates that in adult strength toothpastes. When CPP-ACPF is applied in the oral environment, it will bind to biofilms, plaque and fluoride, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium, phosphate and fluoride.

**IMPORTANT:**
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACPF and the flavor will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACPF and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

**A topical paste containing bio-available calcium, phosphate and fluoride**

- Provides extra protection for teeth.
- Helps neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque.
- Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

**CONTRAINDICATIONS**
Casenin phosphopetides are derived from milk casain. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzocaine preservatives.

**DIRECTIONS FOR USE INDICATIONS**

- Following in-office bleaching procedures.
- After ultrasonic, hand scaling or root planing.
- Following professional tooth whitening (P.T.C.).
- Hypersensitivity prevention and control.
- As an alternative means of applying fluoride topically in children aged 6 and above.
- During orthodontic treatment.
- For high risk caries patients.
- To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
- For special needs adult patients.

- In-office application:**
- Custom tray application**
    - Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
    - Exclude a generous layer of GC MI Paste Plus into the tray and apply to the upper and/or lower teeth.
    - Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
  - Remove the tray.
  - Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
  - Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
  - Any residual GC MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

- Non tray application:**
- If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or paper. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
  - Apply GC MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or applicator. Use the interdental areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
  - Leave GC MI Paste Plus undisturbed for a minimum of 3 minutes.
  - Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Retain the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
  - Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

**Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**

- Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus.
- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**

**Note:**

The overnight use is especially recommended for high-risk adult patients, but is not recommended for children. GC MI Paste Plus should be applied to the tooth surfaces using a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus.

- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**FLAVORS**

Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti

**STORAGE**
Recommended for optimal performance, store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C; 46-77.0°F).

(Shelf life: 2 years from date of manufacture)

**PACKAGES**

- Tube containing 40g (35mL)
- 10 x 40g (2 each) Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti)
- Single Flavor Package
- 1 x 40g tube in each flavor (Vanilla, Strawberry, Melon, Tutti-Frutti, Mint)

**NOTE**

GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.

\*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

**CAUTION**

- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
- It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
- The overnight at home application is not recommended for children under 12.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- In case of spillage on clothes, wash off with water.
- If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzocaine preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at:
http://www.gceurope.com/
They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 10/2016

**MANUFACTURED BY**  
**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

**DISTRIBUTED BY**  
**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

**GC CORPORATION**  
76-1 Masunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

**EU: GC EUROPE N.V.**  
Reserpark Hazrode-Leuven 1240, Interleuvenaan 33, 3000 Leuven, Belgium. TEL: +32 16 74 10 10

**PRINTED IN THE USA**

**RECALDENT** is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

**CAUTION**

- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
- It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
- The overnight at home application is not recommended for children under 12.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- In case of spillage on clothes, wash off with water.
- If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzocaine preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at:
http://www.gceurope.com/
They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 10/2016

**MANUFACTURED BY**  
**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

**DISTRIBUTED BY**  
**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

**GC CORPORATION**  
76-1 Masunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

**EU: GC EUROPE N.V.**  
Reserpark Hazrode-Leuven 1240, Interleuvenaan 33, 3000 Leuven, Belgium. TEL: +32 16 74 10 10

**PRINTED IN THE USA**

Use only under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

EN

## GC MI Paste Plus®

CREME MIT KALZIUM, PHOSPHAT UND FLUORID

Zur Anwendung durch oder unter der Kontrolle durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die angegebenen Indikationen.

**BESCHREIBUNG**
GC MI Paste Plus ist eine wasserbasierte Creme, die RECALDENT™\*\* und eingetbeites Fluorid enthält (CPP-ACPF: Casenin Phosphopetite-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). Der Fluoridgehalt beträgt 0,2% w/w (900ppm), was entspricht dem Fluoridgehalt in Erwachsenenzahnpasta. Bei der Anwendung von CPP-ACP lagert sich dieses an Plaque, Biofilmen, Bakterien, Hydroxyapatiten und Weichgewebe an und gibt bioverfügbares Calcium, Phosphat und Fluorid ab.

**WICHTIG**
Durch Speichel wird die Wirkung der CPP-ACPF erhöht; der Geschmack fördert die Speichelbildung. Je länger CPP-ACPF und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird das Ergebnis.

**GC MI Paste Plus ist eine neue Creme, die bioverfügbares Calcium und Phosphate sowie Fluorid enthält. Die Vorteile sind:**

- einen Extra-Schutz für die Zähne erzugt.
- dabei hilft, Säuren von säurebildenden Bakterien im Plaque zu neutralisieren.
- bei der Neutralisation von anderen Säuren im Mund unterstützt.

**GEGENANZEIGEN**
Casenin-Phospho-Petide werden aus Milchkeisäure gewonnen. GC MI Paste Plus nicht für Patienten mit Milchweissallergie oder einer Allergie / Sensibilisierung auf benzothiazolische Konservierungsmittel anwenden.

**VERWENDUNG**

- INDIKATIONEN**
- nach dem In-office-Bleaching.
  - Nach Ultraschall- oder manueller Zahnreinigung und nach Zahnheitsbehandlungen.
  - Nach der professionellen Zahnreinigung.
  - Vorbereitung und Kontrolle von hypersensitiven.
  - Als alternative Methode der Fluoridierung bei Kinder ab dem 6. Lebensjahr
  - Während einer orthodontischen Behandlung.
  - Bei hohem Kariesrisiko.
  - Als Oberflächenschutz für Patienten, bei denen Erosionen, Xerostomia oder Sjögrens Syndrom auftreten.
  - Für Patienten mit speziellen Bedürfnissen.

**Praxisanwendung:**

- Anwendung mit individuellem Löffel**
  - Vor Gebrauch den individualisierten Löffel unter fließendem Wasser reinigen.
  - Eine großzügige Portion GC MI Paste Plus in den Löffel geben und diesen auf den Zahnoberflächen des Patienten auftragen.
  - Den Löffel für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
  - Den Löffel entfernen.
  - Die Patientin bitten, mit der Zunge die übriggeliebene GC MI Paste Plus im Mund zu verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) die Paste im Mund behalten, ohne diesen dabei zu inhalieren oder zu verschlucken. Je länger GC MI Paste Plus auf der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg!
  - Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC MI Paste Plus löst sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.
- Anwendung ohne Löffel**
  - Wenn nötig, überschüssigen Speichel von den Zahnoberflächen abtupfen; es braucht jedoch nicht mit Druckluft getrocknet zu werden.
  - Eine ausreichende Menge von GC MI Paste Plus mit einem Tupfer, Handschuh der in schwierigen interproximalen Situationen einer Interproximallbürste auf der Zahnoberfläche verteilen.
  - GC MI Paste Plus für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
  - Den Patienten anweisen, mit der Zunge die übriggeliebene GC MI Paste Plus im Mund zu verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) den Schaum im Mund behalten, ohne diesen dabei zu inhalieren oder zu verschlucken. Je länger GC MI Paste Plus auf der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg!
  - Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC MI Paste Plus löst sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.

**Heim Anwendung:**

**Tägliche Anwendung nach dem Zähneputzen, wie vomzahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen**

- Eine ausreichende, mind. Bohnengröße Menge an GC MI Paste Plus jeweils auf er- und unterer Oberflächte aufbringen. Mit einem sauberen Finger oder einem Watteputzer verteilen; in schwierigen interproximalen Bereichen einer Approximallbürste oder Zahnbürste aufbringen.
- GC MI Paste Plus mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
- Anschließend das verbliebene GC MI Paste Plus mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie Möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden. Je länger GC MI Paste Plus und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
- Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC MI Paste Plus können problems in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

**Anwendung am Abend / in der Nacht nach dem Zähneputzen, wie vom zahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen**

**Note:**

Die Anwendung über Nacht wird empfohlen für erwachsene Hochrisikopatienten, nicht aber für Kinder unter 12 Jahren!

- Eine ausreichende, mind. Bohnengröße Menge an GC MI Paste Plus jeweils auf Ober- und unterer Oberflächte aufbringen. Mit einem sauberen Finger oder einem Watteputzer verteilen; in schwierigen approximalen Bereichen mit einer Approximallbürste oder Zahnbürste aufbringen.
- GC MI Paste Plus mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
- Anschließend das verbliebene GC MI Paste Plus mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie Möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden. Je länger GC MI Paste Plus und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
- Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC MI Paste Plus können problems in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

**GESCHMACKSRICHTUNGEN**
Erdbeere, Melone, Vanille, Minze, Tutti-Frutti

**AUFBEWAHRUNG**
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften, an einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht (8-25°C; 46-47,7°F).

**CONSERVATION**
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons de soleil (8-25°C; 46-47,7°F).

**CONDITIONNEMENT**
Tube de 40g (35mL)

1. Coffret assortiment

2. Coffret à usage unique

10 tubes de 40g (Vanille, Fraîse, Melon, Tutti-Frutti, Menthe)

3. Recharge

1 tube de 40g de chaque parfum

**NOTE**

- Utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois peut être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
- Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
- Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
- Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qu'il suivent l'application.

**PARFUMS**
Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti

**CONSERVATION**
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons de soleil (8-25°C; 46-47,7°F).

**CONDITIONNEMENT**
Tube de 40g (35mL)

1. Coffret assortiment

2. Coffret à usage unique

10 tubes de 40g (Vanille, Fraîse, Melon, Tutti-Frutti, Menthe)

3. Recharge

1 tube de 40g de chaque parfum

**NOTE**

- Utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois peut être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qu'il suivent l'application.

**ANMERKUNG**
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
\*RECALDENT is a trademark used under license. CPP-ACP technology has related patents ertitled or angemeldet in Australien, Neuseeland, Europa, Kanada und den USA.

**CAUTION**

- Die Tube immer sofort nach Gebrauch verschließen; Pastenreste oder Feuchtigkeit am Mundrand vermeiden.
- Die Anwendung an Patienten unter 6 Jahren wird nicht empfohlen.
- Die häusliche Anwendung wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen.
- Bei Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen und medizinische Hilfe aufsuchen.
- Spritzer auf der Bekleidung können mit Wasser abgewaschen werden.
- Bei Auftreten von Symptomen eines Angioödems, das auf die Konservierungsstoffe oder andere Inhaltsstoffe von GC MI Paste Plus zurückgeführt werden könnte, ist die Behandlung sofort abzubrechen und der Patient an einen Mediziner zu verweisen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:

http://www.gceurope.com/

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert : 10/2016

## GC MI Paste Plus®

EMULSION TOPIQUE CONTENANT DU CALCIUM, PHOSPHATE ET FLUORURE

Utilisation sous la tutelle d'un professionnel dentaire et selon les recommandations des indications recommandées.

**DESCRIPTION**
GC MI Paste Plus est un crème à base d'eau contenant du RECALDENT™\*\* et du fluorure (CPP-ACPF: Phosphopetite de Caséine-Fluorhydrate de calcium et Fluorure amorphe). Le niveau de fluorure est de 0,2% ww/w (900ppm), ce que l'on trouve en général dans un dentifrice pour adultes. Lorsque CPP-ACPF est appliqué en bouche, il se colle aux biofilms, plaque, bactérie, hydroxyapatite et tissu mou localisant calcium bio-disponible, hydroxyapatite et fluorure.

**IMPORTANT**
La salive va améliorer l'efficacité du CPP-ACPF et le goût stimuler le flux salivaire. Plus le CPP-ACPF et la salive sont maintenus en bouche, plus le résultat sera efficace.

**Une pâte topique contenant calcium, phosphate et fluorure bio disponibles :**

- Procure une meilleure protection des dents.
- Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
- Aide à neutraliser les attaques acides d'autres origines internes ou externes.

**CONTRE-INDICATIONS**
Les phosphopétides de caséine sont dérivés de la caséine de lait de vache. Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle allergie à la caséine du lait de vache et/ou aux conservateurs benzozé.

**MODE D'EMPLOI INDICATIONS**

**A la suite d'un traitement de blanchiment au cabinet.**

- Après ultrasons, rincez abondamment et après surfacage radiculaire.
- Après nettoyage dentaire professionnel.
- Prévention et contrôle de l'hypersensibilité.
- Comme alternative à l'application de fluorure pour les enfants de plus de 6 ans.
- Cours d'un traitement orthodontique.
- Pour les patients à haut risque carieux.
- Pour soulager les patients souffrant d'érosion, xérostomie ou syndrome de Sjögrens.
- Pour patients présentant des exigences particulières.

**Application au Cabinet :**

- Application avec un porte empreinte**
  - Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
  - Appliquez une couche généreuse de GC MI Paste Plus dans le porte empreinte et appliquez sur les dents supérieures et inférieures.
  - Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
  - Retirer le porte-empreinte.
  - Demandez au patient d'étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
  - Demandez au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement.
  - Demandez au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qu'il suivent l'application.
- Application sans porte-empreinte**
  - Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une boulette de coton. Toutefois, il n'est PAS nécessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
  - Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficiles d'accès.
  - Laisser GC MI Paste Plus en place au minimum 3 minutes.
  - Demandez au patient d'étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
  - Demandez au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement.
  - Demandez au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qu'il suivent l'application.

**Application à domicile:**

**Application quotidienne après le brossage des dents comme recommandée par votre dentiste**

- Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
- Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
- Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
- Demandez au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qu'il suivent l'application.

**Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le dentiste**

**Note:**

- Utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois peut être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
- Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
- Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
- Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qu'il suivent l'application.

**PARFUMS**
Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti

**CONSERVATION**
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons de soleil (8-25°C; 46-47,7°F).

**CONDITIONNEMENT**
Tube de 40g (35mL)

1. Coffret assortiment

2. Coffret à usage unique

10 tubes de 40g (Vanille, Fraîse, Melon, Tutti-Frutti, Menthe)

3. Recharge

1 tube de 40g de chaque parfum

**NOTE**

- Utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois peut être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec ou un coton tige. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
- Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
- Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
- Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qu'il suivent l'application.

**PARFUMS**
Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti

**CONSERVATION**
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons de soleil (8-25°C; 46-47,7°F).

**CONDITIONNEMENT**
Tube de 40g (35mL)

1. Coffret assortiment

2. Coffret à usage unique

10 tubes de 40g (Vanille, Fraîse, Melon, Tutti-Frutti, Menthe)

3. Recharge

1 tube de 40g de chaque parfum

**NOTE**

- Utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Appliquez une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois peut être appliquée sur chaque arcade. Étaler avec un doigt propre et sec à l'abri des rayons de soleil (8-25°C; 46-47,7°F).

**ATTENTION**
Toujours placer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte et d'humidité autour du facon et du capuchon.

- Utilisation de GC MI Paste Plus n'est pas indiquée pour les patients de moins de 6 ans.
- Application nocturne à domicile n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
- En cas de projection sur les vêtements, nettoyer à l'eau.
- Si le moindre symptôme d'ango-œdème est observé, il s'agit probablement d'une sensibilité ou allergie au conservateur benzocatoe ou de tout autre composant du produit tel que les agents aromatisants. Dès lors, cesser toute utilisation de ce produit et consulter un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com/
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 10/2016

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:

http://www.gceurope.com/

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert : 10/2016

## GC MI Paste Plus®

CREMA FER USO TOPICO CONTENENTE CALCIO, FOSFATO E FLUORO

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista dentale o sotto la sua supervisione, nelle indicazioni raccomandate.

**DESCRIZIONE**
GC MI Paste Plus è una crema a base acquosa contenente RECALDENT™\*\* con fluoro incorporato (CPP-ACPF: Casena fosfopetite-Calcio amoro fluoro fosfato). Il tenore di fluoro è 0,2% ww/w (900ppm), simile a quello dei dentifrici per adulti. Quando il CPP-ACPF viene applicato in ambiente orale, si lega ai biofilm, alla placca, ai batteri, all'crossapatite e ai tessuti molli, localizzando il calcio, il fosfato e il fluoro biodisponibili.

**AVVERTENZA**
La saliva incrementa l'efficacia del CPP-ACPF e l'aroma contribuisce a stimolare la produzione di saliva. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca del CPP-ACPF e della saliva e migliori saranno i risultati.

**Una pasta per uso topico contenente calcio, fosfato e fluoro biodisponibili :**

- Fornisce una protezione extra per i denti.
- Aiuta a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di batteri acidogeni nella placca.
- Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di altre fonti acide interne ed esterne.

**CONTRAINDICAZIONI**
I fosforopetidi di caséine sono derivati della caséina del latte. Evitare di usare questo materiale sui pazienti notoriamente o probabilmente affetti da allergia alla proteina del latte e/o con sensibilità o allergia ai conservanti benzozati.

**ISTRUZIONI PER L'USO INDICAZIONI**

- Do procedure di sbiancamento in studio.
- Nach ultrasonico, rinceo abbondante o con ultrasuoni o dopo il planning delle radici.
- Dopo un intervento di igiene orale professionale.
- Prevenzione e controllo dell'ipersensibilità.
- Comme metodo alternativo di applicazione topica del fluoro in bambini di età non inferiore ai 6 anni.
- Durante i trattamenti ortodontici.
- Per pazienti ad elevato rischio di carie.
- Per realizzare una protezione topica in pazienti affetti da erosione, xerostomia o sindrome di Sjögren.
- Per pazienti con esigenze speciali.



Prior to use, carefully read the instructions for use.

## GC MI Paste Plus

TOPICAL CREME WITH CALCIUM, PHOSPHATE AND FLUORIDE

For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

**DESCRIPTION**
GC MI Paste Plus is a water based creme containing RECALDENT™\*\* with incorporated fluoride. Contains phosphoric acid (1.0% w/w (900ppm), calcium phosphate fluoride). The level of fluoride is 0.2% w/w (900ppm), which approximates that in adult tooth pastes. When used as directed, RECALDENT is applied in the oral environment. It will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium, phosphate and fluoride.

**IMPORTANT:**
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACPF and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACPF and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

**Topical paste containing bio-available calcium, phosphate and fluoride**

- Provides extra protection for teeth.
- Helps neutralize acid challenges from adogenic bacteria in plaque.
- Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

**CONTRAINDICATIONS**
Casesin phosphoglycates are derived from milk casene. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzate preservatives.

**DIRECTIONS FOR USE**
**INDICATIONS**
a. Following office bleaching procedures.
b. After ultrasonic, hand scaling or root planing.
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.)
d. Following professional interdental cleaning.
e. As an alternative means of applying fluoride topically in children aged 6 and above.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk caries patients.
h. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
i. For special needs adult patients.

**In-office application:**

- Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
- Extrude a generous layer of GC MI Paste Plus into the tray and apply to upper and/or lower dental arches using an interdental toothbrush.
- Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
- Remove the tray.
- Insert the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1- 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
- Any residual GC MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

- II. Non tray application:**
- Use the tongue to spread excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
  - Apply GC MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, finger or interdental toothbrush. Avoid using an interdental toothbrush until the tooth is completely dry.
  - Leave GC MI Paste Plus undisturbed for a minimum of 3 minutes.
  - Then insert the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
  - Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

**At-home application:**
**III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**
Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. Use a pea size amount for each arch is the minimum required. This product should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an interdental toothbrush. Rinse the tooth surfaces clean with water.

- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing.
- The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**
Note:
Overnight use is especially recommended for high-risk adult patients, but not recommended for children under 12.

- Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to the upper and lower teeth. Use a pea size amount for each arch is the minimum required. This product should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an interdental toothbrush. Rinse the tooth surfaces clean with water.
- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**FLAVOURS**
Strawbery (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T)

**STORAGE**
Store in a cool, dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C / 46-77.0°F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture)

**PACKAGES**
Tube containing 40g (35mL)
1. Assorted Package
10 x 40g (2) tubes of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Frutti (T)
Single Flavour Package
10 x 40g in each flavour
Vanilla Strawberry, Melon, Tutti-Frutti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

**NOTE**
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACPF formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACPF technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

- CAUTION**
1. Always replace the cap after use and remove any residual paste or water from the tube before use.
2. It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
3. The overnight at home application is not recommended for children under 12.
4. In case of contact with eyes, wash immediately with water and seek medical attention.
5. In case of spillage on clothes, wash off with water.
6. If any angioedema or allergic reaction symptoms may indicate sensitivity or allergy to the benzate preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Last revised: 02/2011

**MANUFACTURED BY**
GC CORPORATION
7-1, Hachioji 2-chome, Hachioji, Tokyo 147-8585, Japan
**DISTRIBUTED BY**
GC CORPORATION
7-1, Hachioji 2-chome, Hachioji, Tokyo 147-8585, Japan
**EUROPE N.V.**
Beeldingsteunlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium
Tel: +32 16 30 80 50



Prije upotrebu, pažljivo pročitajte upute za uporabu.

## GC MI Paste Plus

ЛОКАЛЕН КРЕМ С КАЛЦИЈИ, ФОСФАТ И ФЛУОРИД

Za upotrebu samo ot stomatolozi za preporučenim indikacijama.

**ОПИСАНИЕ**
GC MI Paste Plus е крем на водној основи, содржачи RECALDENT™\*\* со вклучен флуорид (CPP-ACPF: Казеин фосфопептид - Аморфен Калциев флуорид). Калциев флуорид е 0,2% w/w (900ppm), којшто содржи додатно фосфорен диоксид (1,0% w/w (900ppm)), којшто отпорноста на абразија на збите за збија во возрастите. Когао CPP-ACPF се приложи во устата, се со вврше км биофилма, плаката, бактериите, хидроксиапатита и меките ткивни, што им овозможува биодоступен калциј, фосфат и флуорид.

**ВАЖНО:**
Саливата повошава ефикасноста на CPP-ACPF и ароматизат што стимулира својот одржување. Когаото по-долго останат CPP-ACPF и слюнака в устата, толкова по-ефективен е резултатот.

**Локална паста, содржачка био-достапни калциј, фосфат и флуорид**

- Овозможува дополнителна заштита за збите.
- Спомага за неутрализирање на киселинната атака от ацидогените бактерии в плаката.
- Спомага за неутрализирање на киселинната атака от другите внатрешни извори на киселини в тротоците.

**КОНТРАИДИКАЦИИ**

Казеин фосфопептид се добива от млекано казеин. Не използвайте тоа материал при пациенти с доказана или подозирана алергија или млекано протени или нити с чувствителност или алергии към бензоатни конзерванси.

**НАСОЧИ ЗА УПОТРЕБА**
**INDICATIONS**
a. Following office bleaching procedures.
b. After ultrasonic, hand scaling or root planing.
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.)
d. Following professional interdental cleaning.
e. As an alternative means of applying fluoride topically in children aged 6 and above.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk caries patients.
h. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
i. For special needs adult patients.

**In-office application:**

- Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
- Extrude a generous layer of GC MI Paste Plus into the tray and apply to upper and/or lower dental arches using an interdental toothbrush.
- Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
- Remove the tray.
- Insert the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1- 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
- Any residual GC MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

**II. Non tray application:**

- Use the tongue to spread excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
- Apply GC MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, finger or interdental toothbrush. Avoid using an interdental toothbrush until the tooth is completely dry.
- Leave GC MI Paste Plus undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then insert the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

**At-home application:**
**III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**
Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. Use a pea size amount for each arch is the minimum required. This product should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an interdental toothbrush. Rinse the tooth surfaces clean with water.

- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing.
- The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**
Note:
Overnight use is especially recommended for high-risk adult patients, but not recommended for children under 12.

- Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to the upper and lower teeth. Use a pea size amount for each arch is the minimum required. This product should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an interdental toothbrush. Rinse the tooth surfaces clean with water.
- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

**FLAVOURS**
Strawbery (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T)

**STORAGE**
Store in a cool, dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C / 46-77.0°F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture)

**PACKAGES**
Tube containing 40g (35mL)
1. Assorted Package
10 x 40g (2) tubes of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Frutti (T)
Single Flavour Package
10 x 40g in each flavour
Vanilla Strawberry, Melon, Tutti-Frutti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

**NOTE**
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACPF formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACPF technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

**CAUTION**
1. Always replace the cap after use and remove any residual paste or water from the tube before use.
2. It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
3. The overnight at home application is not recommended for children under 12.
4. In case of contact with eyes, wash immediately with water and seek medical attention.

**MANUFACTURED BY**
GC CORPORATION
7-1, Hachioji 2-chome, Hachioji, Tokyo 147-8585, Japan
**DISTRIBUTED BY**
GC CORPORATION
7-1, Hachioji 2-chome, Hachioji, Tokyo 147-8585, Japan
**EUROPE N.V.**
Beeldingsteunlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium
Tel: +32 16 30 80 50

**CE**

**ЗАБЕЛЕЖКА**
GC MI Paste Plus с неговата уникална CPP-ACPF формула е разработен в Стomatолошкиот факултет на Универзитетот в Мелбурн, Австралија. RECALDENT е търговска марка използвана под лиценз. CPP-ACPF технологията е свързана с патенти и патентни правта в Австралия, НЗ, Европа, Канада и САЩ.

**ВНИМАНИЕ**
1. Винаги сменявайте запечатаната след употреба и отстранявайте остатъците от паста около отвора на тубата или във вътрешността на капачката.
2. Не се препоръчва да използвате GC MI Paste Plus при пациенти под 6 години.
3. Нощното домашно приложение не се препоръчва при деца под 12 години.

- В случай на контакт с очите, промийте незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, промийте незабавно с вода.
- Ако се проявят симптоми на алергия, това може да е сигнал за чувствителност или алергии към бензоатните конзерванси, или към някоя от другите съставки на продукта, като ароматизиращите агенти. В такъв случай, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Последна редакция : 02/2011

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

## GC MI Paste Plus

BIOKATIVNI DENTÁLNÍ KRÉM S VÁPNIKEM, FOSFÁTEM A FLUORIDY

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

**OPIS**
GC MI Paste Plus je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENT™\*\* s přídavkem fluoridu (CPP-ACPF: Kazein fosfopептид - amorfni kalciový fluorid). Kalciový fluorid je 0,2% w/w (900ppm), který obsahuje navíc fosforový dioxid (1,0% w/w (900ppm)), který zvyšuje odolnost zubní pasty proti abrazii. Při aplikaci v ústí usní se vytvoří ochranná zubní pasta z kalcia, fluoridu, baktericidního hydroxyapatitu a okolním měkkým tkáním a dodává lokálně potřebný vápník, fosfat a fluor.

**DŮLEŽITÉ:**

Slina zvyšuje účinnost CPP-ACPF a příchutí pomáhá stimuluovat produkci sliny. Čím déle zubní pasta zůstane v ústech, tím efektivnější je výsledek působení.

**Biokativní krém obsahující volně dostupný vápník, fosfat i fluorid**

- Poskytuje extra ochranu zubů.
- Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsazených v pláku.
- Pomáhá neutralizovat izožen kyseliny z druhých vnitřních i vnějších zdrojů kyseliny.

**KONTRAINDIKACE**

Kazein fosfopептиd se dobva z mléčného kaseinu. Aromatizátor nepoužívejte na pacienty, kteří mají alergii na mléčné proteiny anebo jsou citliví či mají alergii na benzátové přípravky.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**INDIKACE**
a. Po odstranění zubního kamene (ultrazvukem, nástrojem) a následném vyhlazení kofene.
b. Po profesionálním čištění zubů.
c. Nakon ultrazvukové čištění zubů.
d. Nakon profesionálního čištění zubů.
e. Jako alternativní aplikování fluoridu (fluoridace) u dětí starších šesti let.
f. Během ortodontické léčby.
g. Při vysokém riziku kariesu.
h. Pro poskytnutí topického povrchového nátěru.
i. Pro použití u pacientů trpících erozí, xerostomií nebo Sjögrenovým syndromem.
j. Pro dospělé pacienty se speciálními potřebami.

**Aplikace v ordinaci:**

- Aplikace za použití nástroje:**
1. Před použitím očistěte zubní povrchy pod tekoucí vodou.
2. Vytačte dostatečné množství pasty GC MI Paste Plus do nosiče a aplikujte na horní a / nebo dolní oblouk.
3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minut.
4. Vyndejte si zuby.
5. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
6. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
7. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
8. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
9. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
10. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
11. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
12. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
13. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
14. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
15. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
16. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
17. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
18. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
19. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
20. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
21. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
22. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
23. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
24. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
25. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
26. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
27. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
28. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
29. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
30. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
31. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
32. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
33. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
34. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
35. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
36. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
37. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
38. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
39. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
40. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
41. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
42. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
43. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
44. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
45. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
46. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
47. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
48. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
49. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
50. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
51. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
52. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
53. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
54. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
55. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
56. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
57. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
58. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
59. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
60. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
61. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
62. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
63. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
64. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
65. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
66. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
67. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
68. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
69. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
70. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
71. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
72. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
73. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
74. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
75. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
76. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
77. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
78. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
79. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
80. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
81. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
82. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
83. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
84. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
85. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
86. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
87. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
88. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
89. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
90. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
91. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
92. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
93. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
94. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
95. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
96. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
97. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
98. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
99. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
100. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
101. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
102. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
103. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
104. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
105. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
106. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
107. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
108. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
109. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
110. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
111. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
112. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
113. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
114. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
115. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
116. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
117. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
118. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
119. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
120. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
121. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
122. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
123. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
124. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
125. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
126. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
127. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
128. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
129. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
130. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
131. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
132. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
133. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
134. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
135. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
136. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
137. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
138. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
139. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
140. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
141. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
142. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
143. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
144. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
145. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
146. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
147. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
148. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
149. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
150. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
151. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
152. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
153. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
154. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
155. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
156. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
157. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
158. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
159. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
160. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
161. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
162. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
163. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
164. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
165. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
166. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
167. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
168. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
169. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
170. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
171. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
172. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
173. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
174. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
175. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
176. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste Plus v ústech.
177. Počkejte, až pacient vyplivne zbytky GC MI Paste

